Е.А. Петров (Институт прикладной математики и механики НАН Украины, г. Славянск)
Е.А. Севостьянов (Житомирский государственный университет им. И. Франко)

Є.О. Петров (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, м. Слов'янськ)
Є.О. Севостьянов (Житомирський державний університет ім. І. Франко)

E.A. Petrov (Institute of Applied Mathematics and Mechanics of NAS of Ukraine, Slavyansk)
E.A. Sevost'yanov (Zhitomir Ivan Franko State University)

arXiv:1603.03885v1 [math.CV] 12 Mar 2016

О равностепенной непрерывности классов Соболева в областях с локально связной границей

Изучается поведение гомеоморфизмов классов Соболева в замыкании заданной области. Доказано, что замыкании областей, границы которых удовлетворяют определённым ограничениям, указанные классы равностепенно непрерывны, как только их внутренняя дилатация порядка p имеет мажоранту конечного среднего колебания в каждой точке.

Про одностайну неперервність класів Соболєва в областях з локально зв'язною межею

Вивчається поведінка гомеоморфізмів класів Орліча–Соболєва в замиканні заданої області. Доведено, що в замиканні областей, межі яких задовольняють деякі обмеження, зазначені класи є одностайно неперервними, як тільки їх внутряшня порядку p має скінченне середнє коливання в кожній точці.

On equicontinuity of Sobolev classes in domains with locally connected boundary

A behavior of homeomorphisms of Orlicz classes in a closure of a domain is investigated. It is proved that above classes are equicontinuous in the closure of domains with some restrictions on it's boundaries provided that the corresponding inner dilatation of order p has a majorant of finite mean oscillation at every point.

1. Введение. Настоящая работа посвящена изучению гомеоморфизмов с конечным искажением, в частности, Q-гомеоморфизмов, предложенных к изучению О. Мартио и изученных им в совместной монографии [1] (см. также [2] и [3]). Основные определения и обозначения, использующиеся ниже, могут быть найдены в монографии [1] либо статье [4].

В сравнительно недавней публикации одного из авторов Е.А. Севостьянова установлена равностепенная непрерывность в замыкании области некоторого класса гомеоморфизмов (см. [4]). В данной работе мы несколько усилим упомянутые результаты, рассматривая более широкие классы отображений, при которых они всё ещё имеют место. В качестве основных утверждений здесь предлагаются результаты, относящиеся к классам Соболева $W^{1,p}_{loc}$, $p \geqslant 1$, в то время как классы, аналогичные рассмотренным в [4], приводятся в качестве вспомогательных.

Напомним некоторые определения, а также приведём формулировку основных результатов работы. Всюду далее D – область в $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, m – мера Лебега в $\mathbb{R}^n$. Пусть U – открытое множество, $U \subset \mathbb{R}^n$, $u : U \to \mathbb{R}$ – некоторая функция, $u \in L^1_{loc}(U)$. Предположим, что найдётся функция $v \in L^1_{loc}(U)$, такая что

$$\int\limits_U \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(x) u(x) dm(x) = -\int\limits_U \varphi(x) v(x) dm(x)$$

для любой функции $\varphi \in C^0_1(U)$. Тогда будем говорить, что функция v является *обобщённой производной первого порядка функции u по переменной x_i* и обозначать символом: $\frac{\partial u}{\partial x_i}(x) := v$. Функция $u \in W^{1,p}_{loc}(U)$, $p \geqslant 1$, если u имеет обобщённые производные первого порядка по каждой из переменных в U, которые являются локально интегрируемыми в U в степени p. Пусть G – открытое множество в $\mathbb{R}^n$. Отображение $f : D \to \mathbb{R}^n$ принадлежит *классу Соболева* $W^{1,p}_{loc}(G)$, пишем $f \in W^{1,p}_{loc}(G)$, $p \geqslant 1$, если все координатные функции $f = (f_1, \ldots, f_n)$ обладают обобщёнными частными производными первого порядка, которые локально интегрируемы в G в степени p.

Отображение $f : D \to \overline{\mathbb{R}^n}$ обладает *N-свойством* (Лузина), если из условия $m(E) = 0$ следует, что $m(f(E)) = 0$. Отображение $f : D \to \overline{\mathbb{R}^n}$ обладает *N^{-1}-свойством*, если из условия $m(E) = 0$ следует, что $m\left(f^{-1}(E)\right) = 0$.

Для отображений класса $W^{1,1}_{loc}$ и произвольного $p \geqslant 1$ корректно определена так называемая *внутренняя дилатация $K_{I,p}(x, f)$ отображения f порядка p в точке x*, определяемая равенствами

$$K_{I,p}(x, f) \quad = \quad \begin{cases} \frac{|J(x,f)|}{l(f'(x))^p}, & J(x, f) \neq 0, \\ 1, & f'(x) = 0, \\ \infty, & \text{в остальных случаях} \end{cases} . \tag{1}$$

Область D называется *локально связной в точке $x_0 \in \partial D$*, если для любой окрестности U точки x_0 найдется окрестность $V \subset U$ точки x_0 такая, что $V \cap D$ связно, см. [5, 6.49.I]. Следуя [6, раздел 7.22] будем говорить, что борелева функция $\rho\colon X \to [0, \infty]$ является *верхним градиентом* функции $u\colon X \to \mathbb{R}$, если для всех спрямляемых кривых γ, соединяющих точки x и $y \in X$, выполняется неравенство $|u(x) - u(y)| \leqslant \int\limits_\gamma \rho\,|dx|$,

где, как обычно, $\int\limits_{\gamma} \rho\,|dx|$ обозначает линейный интеграл от функции ρ по кривой γ. Будем также говорить, что в указанном пространстве X выполняется $(1;p)$-*неравенство Пуанкаре,* если найдётся постоянная $C \geqslant 1$ такая, что для каждого шара $B \subset X$, произвольной ограниченной непрерывной функции $u\colon X \to \mathbb{R}$ и любого её верхнего градиента ρ выполняется следующее неравенство:

$$\frac{1}{\mu(B)}\int\limits_B |u-u_B|d\mu(x) \leqslant C\cdot(\operatorname{diam} B)\left(\frac{1}{\mu(B)}\int\limits_B \rho^p d\mu(x)\right)^{1/p},$$

где $u_B := \frac{1}{\mu(B)}\int\limits_B u(x)d\mu(x)$. Метрическое пространство (X,d,μ) назовём n-*регулярным по Альфорсу,* если при каждом $x_0 \in X$, некоторой постоянной $C \geqslant 1$ и всех $R < \operatorname{diam} X$

$$\frac{1}{C}R^n \leqslant \mu(B(x_0,R)) \leqslant CR^n\,.$$

Замечание 1. Одним из примеров n-регулярного по Альфорсу пространства относительно евклидовой метрики и меры Лебега в $\mathbb{R}^n$, в котором выполнено $(1;p)$-неравенство Пуанкаре, является единичный шар $\mathbb{B}^n$, см. [7, предложение 2.1].

Согласно [1, разд. 6.1, гл. 6], будем говорить, что функция $\varphi : D \to \mathbb{R}$ имеет *конечное среднее колебание* в точке $x_0 \in D$, пишем $\varphi \in FMO(x_0)$, если $\overline{\lim\limits_{\varepsilon\to 0}} \frac{1}{\Omega_n\varepsilon^n}\int\limits_{B(x_0,\varepsilon)} |\varphi(x) - \overline{\varphi}_{\varepsilon}|\,dm(x) < \infty$, где Ω_n – объём единичного шара $\mathbb{B}^n$ в $\mathbb{R}^n$ и $\overline{\varphi}_{\varepsilon} = \frac{1}{\Omega_n\varepsilon^n}\int\limits_{B(x_0,\,\varepsilon)} \varphi(x)\,dm(x)$.

Пусть (X,d) и (X',d') — метрические пространства с расстояниями d и d', соответственно. Семейство $\mathfrak{F}$ отображений $f : X \to X'$ называется *равностепенно непрерывным в точке* $x_0 \in X$, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$, такое, что $d'\left(f(x), f(x_0)\right) < \varepsilon$ для всех $f \in \mathfrak{F}$ и для всех $x \in X$ таких, что $d(x,x_0) < \delta$. Говорят, что $\mathfrak{F}$ *равностепенно непрерывно*, если $\mathfrak{F}$ равностепенно непрерывно в каждой точке из $x_0 \in X$. Всюду далее, если не оговорено противное, d – одна из метрик в пространстве простых концов относительно области D, упомянутых выше, а d' – евклидова метрика.

Для числа $p \geqslant 1$, областей D, $D' \subset \mathbb{R}^n$, $b_0 \in D$, $b_0' \in D'$ и произвольной измеримой по Лебегу функции $Q(x) : \mathbb{R}^n \to [0,\infty]$, такой, что $Q(x) \equiv 0$ при $x \notin D$, обозначим символом $\mathfrak{F}_{p,b_0,b_0',Q}(D,D')$ семейство всех гомеоморфизмов $f : D \to D'$ класса $W^{1,p}_{loc}$ в D, $f(D) = D'$, таких что $K_{I,p}(x,f) \leqslant Q(x)$ и $f(b_0) = b_0'$. Справедливо следующее утверждение.

Теорема 1. *Пусть $n \geqslant 2$, $n-1 < p \leqslant n$, область D имеет не менее одной конечной граничной точки, D локально связна на границе, область D' ограничена и кроме того, D' является n-регулярным по Альфорсу пространством с евклидовой метрикой и мерой Лебега в $\mathbb{R}^n$, в котором выполнено $(1;p)$-неравенство Пуанкаре. Пусть также $Q \in FMO(\overline{D})$, либо $Q \in L^1_{loc}(D)$ и в каждой точке $x_0 \in \overline{D}$ при некотором $\varepsilon_0 = \varepsilon_0(x_0) > 0$ и всех $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$*

$$\int\limits_{\varepsilon}^{\varepsilon_0} \frac{dt}{t^{\frac{n-1}{n-p}}q_{x_0}^{\frac{1}{p-1}}(t)} < \infty\,, \qquad \int\limits_{0}^{\varepsilon_0} \frac{dt}{t^{\frac{n-1}{n-p}}q_{x_0}^{\frac{1}{p-1}}(t)} = \infty\,,$$

где $q_{x_0}(r):=\frac{1}{\omega_{n-1}r^{n-1}}\int\limits_{|x-x_0|=r} Q(x)\,d\mathcal{H}^{n-1}$. *Тогда каждый элемент* $f\in\mathfrak{F}_{p,b_0,b_0',Q}(D,D')$ *продолжается до непрерывного отображения* $\overline{f}:\overline{D}\to\overline{D'}$, *при этом, семейство отображений* $\overline{\mathfrak{F}}_{p,b_0,b_0',Q}(D,D')$, *состоящее из всех продолженных таким образом гомеоморфизмов, является равностепенно непрерывным, а значит, и нормальным в* $\overline{D}$.

2. Основные леммы. Равностепенная непрерывность кольцевых гомеоморфизмов. Пусть E, $F\subset\overline{\mathbb{R}^n}$ – произвольные множества. Обозначим через $\Gamma(E,F,D)$ семейство всех кривых $\gamma:[a,b]\to\overline{\mathbb{R}^n}$, которые соединяют E и F в D, т.е. $\gamma(a)\in E$, $\gamma(b)\in F$ и $\gamma(t)\in D$ при $t\in(a,b)$. Дальнейшее изложение существенно опираются на аппарат нак называемых Q-гомеоморфизмов относительно p-модуля (см. [1, глава 7]). Дадим определение этого класса отображений. Пусть $x_0\in\overline{D}$, тогда отображение $f:D\to\overline{\mathbb{R}^n}$ будем называть *кольцевым* Q*-отображением относительно* p*-модуля в точке* x_0, если для каждых $0<r_1<r_2<d_0:=\sup\limits_{x\in D}|x-x_0|$

$$M_p(f(\Gamma(S_1,S_2,D)))\leqslant\int\limits_{A(x_0,r_1,r_2)\cap D}Q(x)\eta^p(|x-x_0|)dm(x)\,, \tag{2}$$

где

$$A(x_0,r_1,r_2)=\{x\in\mathbb{R}^n:r_1<|x-x_0|<r_2\}\,, \tag{3}$$

$S_i=S(x_0,r_i)$, $i=1,2$, и $\eta:(r_1,r_2)\to[0,\infty]$ – произвольная измеримая по Лебегу функция такая, что

$$\int\limits_{r_1}^{r_2}\eta(r)dr=1\,. \tag{4}$$

Справедливо следующее утверждение (см. [8, предложение 4.7]).

Предложение 1. *Пусть* X *—* α*-регулярное по Альфорсу метрическое пространство с мерой, в котором выполняется* $(1;p)$*-неравенство Пуанкаре,* $\alpha-1\leqslant p\leqslant\alpha$. *Тогда для произвольных континуумов* E *и* F, *содержащихся в шаре* $B(x_0,R)$, *и некоторой постоянной* $C>0$ *выполняется неравенство* $M_p(\Gamma(E,F,X))\geqslant\frac{1}{C}\cdot\frac{\min\{\operatorname{diam}E,\operatorname{diam}F\}}{R^{1+p-\alpha}}$.

Имеет место следующее утверждение, обобщающее [4, лемма 3.1] на случай произвольного порядка p модуля семейств кривых.

Лемма 1. *Пусть* $n\geqslant 2$, $p\in(n-1,n]$, *область* $D\subset\mathbb{R}^n$ *локально связна в точках границы,* $x_0\in\partial D$, $x_0\neq\infty$, *измеримая по Лебегу функция* $Q:\mathbb{R}^n\to[0,\infty]$ *равна нулю вне области* D, *а отображение* $f:D\to\overline{\mathbb{R}^n}$ *является кольцевым* Q*-гомеоморфизмом в точке* x_0 *относительно* p*-модуля, таким что* $b_0'=f(b_0)$ *для некоторых* $b_0\in D$ *и* $b_0'\in D'=f(D)$. *Пусть также* D' *ограничена и является является* n*-регулярным по Альфорсу пространством с евклидовой метрикой и мерой Лебега в* $\mathbb{R}^n$, *в котором выполнено* $(1;p)$*-неравенство Пуанкаре. Предположим, найдётся* $\varepsilon_0=\varepsilon(x_0)>0$, *такое, что при некотором* $0<p'<p$, $\varepsilon\to 0$ *и некоторой постоянной* $K>0$ *выполнено условие*

$$\int\limits_{A(x_0,\varepsilon,\varepsilon_0)}Q(x)\cdot\psi^p(|x-x_0|)\,dm(x)\leqslant K\cdot I^{p'}(\varepsilon,\varepsilon_0)\,, \tag{5}$$

где сферическое кольцо $A(x_0,\varepsilon,\varepsilon_0)$ определено как в (3), а ψ – некоторая заданная неотрицательная измеримая функция, такая, что при всех $\varepsilon\in(0,\varepsilon_0)$

$$I(\varepsilon,\varepsilon_0):=\int\limits_{\varepsilon}^{\varepsilon_0}\psi(t)\,dt<\infty\,, \tag{6}$$

при этом, $I(\varepsilon,\varepsilon_0)\to\infty$ при $\varepsilon\to 0$. Тогда найдётся число $\widetilde{\varepsilon_0}=\widetilde{\varepsilon_0}(x_0)\in(0,\varepsilon_0)$ такое, что при каждом $\sigma\in(0,\widetilde{\varepsilon_0})$ и любого континуума $E_1\subset B(x_0,\sigma)\cap D$ выполнено неравенство

$$\operatorname{diam} f(E_1)\leqslant C\cdot R^{1+p-n}\cdot K\cdot I^{p'-p}(\sigma,\varepsilon_0)\cdot\Delta(\sigma,\widetilde{\varepsilon_0},\varepsilon_0)\,, \tag{7}$$

где $\operatorname{diam} f(E_1)$ – евклидов диаметр множества $f(E_1)$,

$$\Delta(\sigma,\widetilde{\varepsilon_0},\varepsilon_0)=\left(\begin{array}{c}\int\limits_{\sigma}^{\varepsilon_0}\psi(t)\,dt\\ 1+\dfrac{}{\int\limits_{\sigma}^{\widetilde{\varepsilon_0}}\psi(t)\,dt}\end{array}\right)^{p}\,, \tag{8}$$

$\delta=\frac{1}{2}\cdot d\left(b_0',\partial D'\right)$, d – евклидово расстояние между множествами, R – радиус шара, содержащего область D', а C – постоянная из предложения 1.

Доказательство. Если граница ∂D области D содержит ещё хотя бы одну точку $y_0\in\partial D$, $y_0\neq\infty$, введём её в рассмотрение. В противном случае полагаем $y_0:=\infty$. Выберем $\varepsilon_1\in(0,\varepsilon_0)$ так, чтобы точка b_0 может быть соединена непрерывной кривой с точкой y_0, лежащей целиком в $D\setminus B(x_0,\varepsilon_1)$, кроме своей концевой точки y_0. Заметим, что это возможно сделать, так как область D, по условию, предполагалась локально связной в любой точке границы (см. [1, предложение 13.2, гл. 13]). Последнюю кривую обозначим через E_3. Не ограничивая общности, можно считать, что $I(\varepsilon_1,\varepsilon_0)>0$, так как по условию $I(\varepsilon,\varepsilon_0)\to\infty$ при $\varepsilon\to 0$. Хорошо известно, что предельное множество $C(\partial G,g)$ лежит на границе области $G':=g(G)$, как только $g:G\to G'$ — гомеоморфизм (см., напр., [1, предложение 13.5, гл. 13]). Учитывая сказанное выше, $C(y_0,f)\in\partial D'$. Отсюда вытекает, что найдётся точка $a_0\in E_3$, такая, что

$$d\left(b_0',f(a_0)\right)\geq\frac{1}{2}\cdot d\left(b_0',\partial D'\right):=\delta\,, \tag{9}$$

где d обозначает евклидово расстояние между множествами. Замкнутую подкривую кривой E_3, соединяющую точки a_0 и b_0 в D, обозначим через E_2. Пусть $\sigma\in(0,\varepsilon_1)$, $E_1\subset\overline{B(x_0,\sigma)}\cap D$ — произвольный континуум.

Рассмотрим измеримую функцию

$$\eta_{\sigma}(t)=\left\{\begin{array}{rr}\psi(t)/I(\sigma,\varepsilon_1), & t\in(\sigma,\varepsilon_1),\\ 0, & t\notin(\sigma,\varepsilon_1)\,,\end{array}\right.$$

где, как и прежде, величина $I(a,b)$ определяется соотношением $I(a,b)=\int\limits_a^b\psi(t)\,dt$. Заметим, что функция $\eta_{\sigma}(t)$ удовлетворяет соотношению вида (4), где вместо r_1 и r_2 участвуют σ и ε_1, соответственно. Заметим, что $\Gamma\left(E_1,E_2,D\right)>\Gamma(S(x_0,\sigma),S(x_0,\varepsilon_1),D)$ и значит, $f(\Gamma\left(E_1,E_2,D\right))>f(\Gamma(S(x_0,\sigma),S(x_0,\varepsilon_1),D))$, откуда

$$M_p(f(\Gamma\left(E_1,E_2,D\right)))\leqslant M_p(f(\Gamma(S(x_0,\sigma),S(x_0,\varepsilon_1),D))$$

(см. [9, теорема 6.4]). В таком случае, ввиду условий (5)–(6)

$$M_p\left(\Gamma\left(f(E_1), f(E_2), D'\right)\right) =$$

$$= M_p\left(f\left(\Gamma\left(E_1, E_2, D\right)\right)\right) \leqslant M_p(f(\Gamma(S(x_0,\sigma), S(x_0,\varepsilon_1), D))) \leqslant \tag{10}$$

$$\leqslant \frac{K\cdot I^{p'}(\sigma,\varepsilon_0)}{I^p(\sigma,\varepsilon_1)} = K\cdot I^{p'-p}(\sigma,\varepsilon_0)\cdot\Delta(\sigma,\varepsilon_1,\varepsilon_0)\,,$$

где Δ определяется из соотношения (8). С другой стороны, по предложению 1

$$\min\{\operatorname{diam} f(E_1), \operatorname{diam} f(E_2)\} \leqslant CR^{1+p-n}M_p\left(\Gamma\left(f(E_1), f(E_2), D'\right)\right)\,, \tag{11}$$

где R – радиус шара, содержащего область D'.

Поскольку из (10) вытекает, что $M_p\left(\Gamma\left(f(E_1), f(E_2), D'\right)\right) \to 0$ при $\sigma\to 0$, то ввиду (11) можно выбрать $\widetilde{\varepsilon_0}\in(0,\varepsilon_1)$ таким, что что при каждом $\sigma\in(0,\widetilde{\varepsilon_0})$ и любого континуума $E_1\subset B(x_0,\sigma)\cap D$ будет выполнено следующее условие: $\min\{\operatorname{diam} f(E_1), \operatorname{diam} f(E_2)\} < \delta$. Но из (9) следует, что $\operatorname{diam} f(E_2) \geqslant \delta$ и, значит, $\min\{\operatorname{diam} f(E_1), \operatorname{diam} f(E_2)\} = \operatorname{diam} f(E_1)$. Тогда по неравенству (11)

$$\operatorname{diam} f(E_1) \leqslant CR^{1+p-n}M_p\left(\Gamma\left(f(E_1), f(E_2), D'\right)\right)\,. \tag{12}$$

В этом случае, из (10) и (12) вытекает, что

$$\operatorname{diam} f(E_1) \leqslant C\cdot R^{1+p-n}\cdot K\cdot I^{p'-p}(\sigma,\varepsilon_0)\cdot\Delta(\sigma,\varepsilon_1,\varepsilon_0)\,. \tag{13}$$

Осталось лишь заметить, что $\Delta(\sigma,\varepsilon_1,\varepsilon_0) < \Delta(\sigma,\widetilde{\varepsilon_0},\varepsilon_0)$, что следует прямо из определения величины Δ в (8), так что из (13) вытекает соотношение (7). Лемма доказана. $\Box$

Для заданных областей D, $D'\subset\mathbb{R}^n$, $n\geq 2$, $n-1<p\leqslant n$, измеримой по Лебегу функции $Q(x):\mathbb{R}^n\to[0,\infty]$, $Q(x)\equiv 0$ при $x\notin D$, $b_0\in D$, $b_0'\in D'$, обозначим через $\mathfrak{G}_{p,b_0,b_0',Q}\left(D,D'\right)$ семейство всех кольцевых Q-гомеоморфизмов $f:D\to D'$ в $\overline{D}$ относительно p-модуля, таких что $f(D)=D'$, $b_0'=f(b_0)$. В наиболее общей ситуации основное утверждение настоящего раздела может быть сформулировано следующим образом.

Лемма 2. *Пусть $p\in(n-1,n]$, область D локально связна на границе и имеет не менее одной конечной граничной точки, а область D' ограничена, имеет локально квазиконформную границу и, одновременно, является пространством n-регулярным по Альфорсу относительно евклидовой метрики и меры Лебега в $\mathbb{R}^n$, в котором выполнено $(1;p)$-неравенство Пуанкаре.*

Предположим, что для каждого $x_0\in\overline{D}$ найдётся $\varepsilon_0=\varepsilon(x_0)>0$, такое, что при некотором $0<p'<p$ и $\varepsilon\to 0$ выполнено условие (5), где сферическое кольцо $A(x_0,\varepsilon,\varepsilon_0)$ определено как в (3), а ψ – некоторая неотрицательная измеримая функция, такая, что при всех $\varepsilon\in(0,\varepsilon_0)$ выполнено условие (6), при этом, $I(\varepsilon,\varepsilon_0)\to\infty$ при $\varepsilon\to 0$.

Тогда каждое $f\in\mathfrak{G}_{p,b_0,b_0',Q}\left(D,D'\right)$ продолжается до непрерывного отображения $f:\overline{D}\to\overline{D'}$, при этом семейство таким образом продолженных отображений является равностепенно непрерывным в $\overline{D}$.

Доказательство. Каждое отображение f имеет непрерывное продолжение на $\overline{D}$ в силу [10, лемма 1]. Равностепенная непрерывность семейства $\mathfrak{G}_{p,b_0,b_0',Q}\left(D,D'\right)$ во внутренних точках области D следует, например, из [11, лемма 3].

Осталось показать равностепенную непрерывность $\mathfrak{G}_{p,b_0,b_0',Q}(D,D')$ на ∂D.

Предположим противное, а именно, что семейство отображений $\mathfrak{G}_{p,b_0,b_0',Q}(D,D')$ не является равностепенно непрерывным в некоторой точке $x_0\in\partial D$. Тогда найдутся число $a>0$, последовательность $y_k\in\overline{D}$, $k=1,2,\ldots$ и элементы $f_k\in\mathfrak{G}_{p,b_0,b_0',Q}(D,D')$ такие, что $d(y_k,x_0)<1/k$ и

$$|f_k(y_k)-f_k(x_0)|\geqslant a\quad\forall\quad k=1,2,\ldots,\,. \tag{14}$$

Ввиду возможности непрерывного продолжения каждого f_k на границу D в терминах простых концов, для всякого $k\in\mathbb{N}$ найдётся элемент $x_k\in D$ такой, что $d(x_k,y_k)<1/k$ и $|f_k(x_k)-f_k(y_k)|<1/k$. Тогда из (14) вытекает, что

$$|f_k(x_k)-f_k(x_0)|\geqslant a/2\quad\forall\quad k=1,2,\ldots,\,. \tag{15}$$

Аналогично, в силу непрерывного продолжения отображения f_k в $\overline{D}$ найдётся последовательность $x_k'\in D$, $x_k'\rightarrow x_0$ при $k\rightarrow\infty$ такая, что $|f_k(x_k')-f_k(x_0)|<1/k$ при $k=1,2,\ldots$. Тогда из (15) вытекает, что

$$|f_k(x_k)-f_k(x_k')|\geqslant a/4\quad\forall\quad k=1,2,\ldots,\,. \tag{16}$$

Поскольку по условию область D является локально связной на границе, то найдётся последовательность окрестностей V_m точки x_0, $m=1,2,\ldots$, лежащих в шаре $B(x_0,2^{-m})$, такая что $W_m:=V_m\cap D$ есть связное множество при каждом $m\in\mathbb{N}$, а так как x_k и $x_k'\rightarrow x_0$ при $k\rightarrow\infty$, то найдётся подпоследовательность номеров m_k, $k=1,2,\ldots$, такая что $x_{m_k}\in W_k$ и $x_{m_k}'\in W_k$. Соединим точки x_{m_k} и x_{m_k}' кривой C_k, лежащей в W_k. Тогда при достаточно больших k число 2^{-k} меньше числа $\widetilde{\varepsilon}_0$ из леммы 1, поэтому в этой лемме можно положить $E_1:=C_k$. В таком случае, из леммы 1 вытекает, что

$$|f_{m_k}(x_{m_k})-f_{m_k}(x_{m_k}')|\leqslant\operatorname{diam}f_{m_k}(C_k)\leqslant$$

$$\leqslant C\cdot R^{1+p-n}\cdot K\cdot I^{p'-p}(2^{-k},\varepsilon_0)\cdot\Delta(2^{-k},\widetilde{\varepsilon}_0,\varepsilon_0)\rightarrow 0\,,\quad k\rightarrow\infty\,, \tag{17}$$

что противоречит (16). Полученное противоречие указывает на то, что исходное предположение об отсутствии равностепенной непрерывности семейства $\mathfrak{G}_{p,b_0,b_0',Q}(D,D')$ было неверным. $\square$

Основное утверждение настоящего раздела может быть сформулировано следующим образом.

Теорема 2. *Пусть $p\in(n-1,n]$, область D локально связна на границе и имеет не менее одной конечной граничной точки, а область D' ограничена, имеет локально квазиконформную границу и, одновременно, является пространством n-регулярным по Альфорсу относительно евклидовой метрики и меры Лебега в $\mathbb{R}^n$, в котором выполнено $(1;p)$-неравенство Пуанкаре.*

Предположим,

1) $Q\in FMO(\overline{D})$, либо

2) в каждой точке $x_0\in\overline{D}$ при некотором $\varepsilon_0=\varepsilon_0(x_0)>0$ и всех $0<\varepsilon<\varepsilon_0$

$$\int\limits_{\varepsilon}^{\varepsilon_0}\frac{dt}{t^{\frac{n-1}{n-p}}q_{x_0}^{\frac{1}{p-1}}(t)}<\infty\,,\qquad\int\limits_{0}^{\varepsilon_0}\frac{dt}{t^{\frac{n-1}{n-p}}q_{x_0}^{\frac{1}{p-1}}(t)}=\infty\,,$$

где $q_{x_0}(r):=\frac{1}{\omega_{n-1}r^{n-1}}\int\limits_{|x-x_0|=r}Q(x)\,d\mathcal{H}^{n-1}$.

Тогда каждое $f\in\mathfrak{G}_{p,b_0,b_0',Q}(D,D')$ *продолжается до непрерывного отображения* $f:\overline{D}\to\overline{D'}$, *при этом семейство таким образом продолженных отображений является равностепенно непрерывным в* $\overline{D}$.

Доказательство теоремы 2 сводится к тому, что условия 1) и 2), накладывающие ограничения на функцию Q, влекут выполнение условий (5)–(6). Действительно, пусть вначале имет место условие 1). Не ограничивая общности, можно считать, что $x_0=0$. Пусть $Q\in FMO(0)$ и $\varepsilon_0<\min\{\,\mathrm{dist}\,(0,\,\partial D)\,,\;e^{-1}\}$. На основании [1, следствие 6.3, гл. 6] для функции $0<\psi(t)=\frac{1}{\left(t\,\log\frac{1}{t}\right)^{n/p}}$ будем иметь, что

$$\int\limits_{\varepsilon<|x|<\varepsilon_0}Q(x)\cdot\psi^p(|x|)\;dm(x)\;=\int\limits_{\varepsilon<|x|<\varepsilon_0}\frac{Q(x)\,dm(x)}{\left(|x|\,\log\frac{1}{|x|}\right)^n}=O\left(\log\log\frac{1}{\varepsilon}\right)$$

при $\varepsilon\to0$. Заметим также, что при указанных выше ε выполнено $\psi(t)\geq\frac{1}{t\,\log\frac{1}{t}}$, поэтому $I(\varepsilon,\varepsilon_0)\;:=\int\limits_{\varepsilon}^{\varepsilon_0}\psi(t)\,dt\;\geq\log\frac{\log\frac{1}{\varepsilon}}{\log\frac{1}{\varepsilon_0}}$. Тогда

$$\int\limits_{\varepsilon<|x|<\varepsilon_0}Q(x)\cdot\psi^p(|x|)\;dm(x)\leq C\cdot I(\varepsilon,\varepsilon_0)$$

при $\varepsilon\to0$. Таким образом, мы имеем соотношения вида (5)–(6), а, значит, в ситуации 1) заключение теоремы 2 вытекает из леммы 2.

Покажем, что аналогичное заключение можно сделать и в случае 2). Положим в этом случае

$$\psi(t)=\begin{cases}1/[t^{\frac{n-1}{p-1}}q_{x_0}^{\frac{1}{p-1}}(t)]\;, & t\in(0,\varepsilon_0)\;,\\ 0\;, & t\notin(0,\varepsilon_0)\;.\end{cases}\tag{18}$$

Тогда ввиду теоремы Фубини

$$\int\limits_{\varepsilon<|x-x_0|<\varepsilon_0}Q(x)\cdot\psi^p(|x-x_0|)\;dm(x)=\omega_{n-1}\int\limits_{\varepsilon}^{\varepsilon_0}\frac{dr}{r^{\frac{n-1}{p-1}}q_{x_0}^{\frac{1}{p-1}}(r)}=\omega_{n-1}\cdot I(\varepsilon,\varepsilon_0)\,,$$

где, как и прежде, величина $I(a,b)$ определяется соотношением $I(a,b)=\int\limits_a^b\psi(t)\,dt$, а ω_{n-1} – площадь единичной сферы в $\mathbb{R}^n$. Следовательно, вновь выполнены соотношения (5)–(6), а, значит, в ситуации 2) мы также получаем интересующее нас заключение из леммы 2. $\Box$

4. Доказательство основного результата – теоремы 1. Для доказательства теоремы 1 покажем, что каждое отображение $f\in\mathfrak{F}_{p,b_0,b_0',Q}(D,D')$ принадлежит также классу $\mathfrak{G}_{p,b_0,b_0',Q}(D,D')$ (см. определения этих классов перед теоремой 1 и перед леммой 2). Действительно, пусть $f\in\mathfrak{F}_{p,b_0,b_0',Q}(D,D')$, тогда в частности, $f\in W^{1,p}_{loc}$, $p>n-1$. Отсюда ввиду [12, теорема 1.1] $f^{-1}\in W^{1,1}_{loc}$. Поскольку отображение f обладает N-свойством Лузина, в силу замены переменной под знаком интеграла (см. [13,

теорема 3.2.5]) для любого компакта $K \subset f(D)$

$$\int\limits_K \|g'(y)\|^p dm(y) = \int\limits_{f^{-1}(K)} K_{I,p}(x,f)dm(x) < \int\limits_{f^{-1}(K)} Q(x)dm(x) < \infty\,,$$

где $g(y) = f^{-1}(y)$, откуда $f^{-1} \in W^{1,p}_{loc}$. Кроме того, так как $f \in W^{1,p}_{loc}$, $p > n-1$, то f является дифференцируемым почти всюду (см. [14, лемма 3]).

Таким образом, f является дифференцируемым почти всюду отображением, обладающим N- и N^{-1}-свойствами Лузина, таким что $f^{-1} \in W^{1,p}_{loc}$ и $K_{I,p}(x,f) \leqslant Q(x)$, а указанные отображения удовлетворяют неравенствам вида (2), что следует из [15, теорема 2.2]. Таким образом, $\mathfrak{F}_{p,b_0,b_0',Q}(D,D') \subset \mathfrak{G}_{p,b_0,b_0',Q}(D,D')$ и, значит, заключение теоремы 1 вытекает из теоремы 2. $\Box$

Список литературы

[1] *Martio O., Ryazanov V., Srebro U. and Yakubov E.* Moduli in Modern Mapping Theory. – New York: Springer Science + Business Media, LLC, 2009.

[2] *Iwaniec T., G. Martin.* Geometrical Function Theory and Non-Linear Analysis. – Oxford: Clarendon Press, 2001.

[3] *Gutlyanskii V.Ya., Ryazanov V.I., Srebro U., Yakubov E.* The Beltrami Equation: A Geometric Approach. – New York etc.: Springer, 2012.

[4] *Севостьянов Е.А.* О равностепенной непрерывности гомеоморфизмов с неограниченной характеристикой // Математические труды. – 2012. – **15**, № 1. – С. 178–204.

[5] *Куратовский К.* Топология, Т. 2. – М.: Мир, 1969.

[6] *Heinonen J.* Lectures on Analysis on metric spaces. – New York: Springer Science+Business Media, 2001.

[7] *Sevost'yanov E.A.* On open and discrete mappings with a modulus condition // Ann. Acad. Sci. Fenn. – 2016. – **41**. – P. 41—50.

[8] *Adamowicz T. and Shanmugalingam N.* Non-conformal Loewner type estimates for modulus of curve families // Ann. Acad. Sci. Fenn. Math. – 2010. – V. **35**. – P. 609—626.

[9] *Väisälä J.* Lectures on n-Dimensional Quasiconformal Mappings. Lecture Notes in Math., V. 229. – Berlin etc.: Springer–Verlag, 1971.

[10] *Севостьянов Е.А.* О равностепенной непрерывности отображений с ветвлением в замыкании области // Укр. матем. ж., в печати; опубликовано в виде электронного препринта на сайте www. arxiv. org, arXiv:1505.06490.

[11] *Севостьянов Е.А.* О некоторых свойствах обобщённых квазиизометрий с неограниченной характеристикой // Укр. матем. ж. – 2011. – Т. **63**, № 3. – С. 385–398.

[12] *Ziemer W. P.* Change of variables for absolutely continuous functions // Duke Math. J. – 1969. – V. **36**. – P. 171—178.

[13] *Федерер Г.* Геометрическая теория меры. – Москва: Наука, 1987.

[14] *Väisälä J.* Two new characterizations for quasiconformality // Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A 1 Math. – 1965. – V. **362**. – P. 1–12.

[15] *Salimov R.R. and Sevost'yanov E.A.* The Poletskii and Väisälä inequalities for the mappings with (p, q)-distortion // Complex Variables and Elliptic Equations. – 2014. – V. **59**, no. 2. – P. 217–231.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Евгений Александрович Петров
Институт прикладной математики и механики
НАН Украины, комн. 417
ул. генерала Батюка, 19
г. Славянск, Украина, 84 116
e-mail: eugeniy.petrov@gmail.com

Евгений Александрович Севостьянов
Житомирский государственный университет им. И. Франко
ул. Большая Бердичевская, 40
г. Житомир, Украина, 10 008
тел. +38 066 959 50 34 (моб.), e-mail: esevostyanov2009@mail.ru